



# La PI3-kinase

## De la synapse immunologique au contrôle de la prolifération T

### PI3-kinase

#### Linking immunological synapse to T-cell proliferation

Stéphanie Fabre, Valérie Lang and Georges Bismuth

Volume 22, Number 10, octobre 2006

Biophotonique et imagerie

URI: <https://id.erudit.org/iderudit/013822ar>

[See table of contents](#)

#### Publisher(s)

SRMS: Société de la revue médecine/sciences  
Éditions EDK

#### ISSN

0767-0974 (print)  
1958-5381 (digital)

[Explore this journal](#)

#### Cite this article

Fabre, S., Lang, V. & Bismuth, G. (2006). La PI3-kinase : de la synapse immunologique au contrôle de la prolifération T. *M/S : médecine sciences*, 22(10), 872–877.

#### Article abstract

T cell clonal expansion contributing to host defense against pathogens is a tightly controlled process to maintain the homeostasis of the immune system. Our understanding of how T cell growth and proliferation are controlled following antigenic stimulation is therefore a major challenge. Antigen recognition occurs when a naive T lymphocyte contacts an antigen-presenting cell. A specialized junction enriched in T-cell receptors, costimulation molecules and signaling adaptors, called the immunological synapse, is then created for several hours between the two cell types. Recent discoveries now clarify the molecular mechanisms used by this organization to control T cell growth and proliferation. It has been established that the immunological synapse functions in fact as an integrative platform where class Ia phosphoinositide-3-kinases (PI3Ks) are recruited and activated to continuously produce high levels of 3'-phosphoinositides. These lipids regulate the localization and the activation of a wide range of PH-domain containing proteins, among which the serine-threonine kinase Akt, a downstream effector of PI3Ks, appears to be a key player. FoxO (Forkhead subgroup O) family members control in various cell systems genes implicated in apoptosis, stress resistance and cell cycle arrest, thereby contributing to maintain quiescence in unstimulated cells. In naive T cells contacting antigen-presenting cells a rapid but also very prolonged nuclear exclusion of these transcription factors is observed downstream of Akt. Mainly, this compartmentalization process is mandatory to induce T cell growth triggered by the T cell/antigen-presenting cell interaction. These findings demonstrate that to initiate cell cycle progression the formation of the immunological synapse is an undemanding tactic used by primary T cells to securely maintain the 3'-phosphoinositide-dependent mitotic switch governed by the spatial control of FoxO transcription factors.


> Le contrôle de la quiescence lymphocytaire est un élément essentiel à l'homéostasie du système immunitaire. Cet état quiescent est activement maintenu par des facteurs transcriptionnels nucléaires, de la famille FoxO (*Forkhead subgroup O*) notamment. Cet équilibre est cependant rompu à la suite de la reconnaissance de l'antigène, ce qui déclenche la division cellulaire. Cet article fait le point des données récemment acquises sur les mécanismes moléculaires impliqués dans ce phénomène. Il décrit ainsi comment la synapse immunologique formée entre un lymphocyte T et une cellule présentant l'antigène constitue une plate-forme d'intégration au sein de laquelle il existe une production continue de 3'-phospho-inositides sous l'impulsion des phosphoinositides-3-kinases. En provoquant l'activation de la sérine-thréonine kinase Akt, ce processus stimule l'exclusion nucléaire des FoxO pour lever le frein permanent qu'ils exercent et permettre l'expansion clonale des cellules T en réponse à l'antigène. <

### Activation de la PI3-kinase à la synapse immunologique

L'activation d'un lymphocyte T (LT) naïf par les complexes CMH-peptide présents à la surface des cellules présentant l'antigène (CPA) s'accompagne de la mise en place, à l'interface entre les deux cellules, d'une jonction spécialisée caractérisée par une ségrégation spatiale plus ou moins organisée des récepteurs à l'antigène (TCR), de molécules d'adhésion et de costimulation [1]. La formation de cette jonction, baptisée synapse immunologique, requiert d'importants remaniements du cytosquelette de la cellule T et est associée à des cascades de phosphorylation sur tyrosine conduisant au recrutement et à l'activation séquentielle de nombreuses molécules de signalisation. L'interaction mise en place reste stable pendant plusieurs heures, une caractéristique remarquable révélée

## La PI3-kinase De la synapse immunologique au contrôle de la prolifération T

Stéphanie Fabre, Valérie Lang, Georges Bismuth




Inserm U567, CNRS UMR 8104,  
Université Paris 5 -  
Faculté de Médecine  
René Descartes, Institut Cochin,  
Département  
de Biologie cellulaire,  
22, rue Méchain, 75014 Paris,  
France.  
[fabre@cochin.inserm.fr](mailto:fabre@cochin.inserm.fr)

par de nombreuses études *in vitro* et confirmée plus récemment *in vivo* au sein du ganglion lymphatique par des approches de microscopie bi-photonique en temps réel [2]. Cette interaction prolongée est un paramètre critique nécessaire à l'activation des réponses biologiques T-spécifiques telles que la production d'IL-2 ou d'IFN- $\gamma$ , mais aussi à la prolifération cellulaire [3, 4]. L'activation des phosphoinositide-3-kinases (PI3K) lors de la formation de la synapse immunologique a été récemment rapportée [5, 6]. Il apparaît aujourd'hui que l'activation soutenue dans le temps de cette voie métabolique est un élément de signalisation essentiel dans les cellules T, à l'origine de conséquences fonctionnelles majeures.

Les PI3K forment une vaste famille d'enzymes phosphorylant des phospholipides membranaires, les phosphoinositides (PI), sur la position 3 du groupement inositol. Elles sont réparties en trois classes majeures sur la base de leur structure et de la spécificité de leurs substrats, et sont généralement constituées d'une sous-unité catalytique et d'une sous-unité régulatrice. Les PI3K impliquées dans l'activation lymphocytaire sont les PI3K de classe I. Elles utilisent comme substrats le PtdIns(4)P (phosphatidylinositol 4-phosphate), le PtdIns(4, 5)P<sub>2</sub> ou le PtdIns(5)P et sont subdivisées en deux sous-groupes : I<sub>A</sub>, activées en aval de récepteurs couplés à des tyrosine kinases tels que les

récepteurs B et T à l'antigène, les récepteurs aux cytokines et certaines molécules de costimulation ;  $I_b$ , activées en aval de récepteurs couplés aux protéines G tels que les récepteurs aux chimiokines [7]. Les PI3K de classe  $I_A$  sont des enzymes hétérodimériques constituées d'une sous-unité régulatrice (p85 $\alpha$ , la plus abondante, et ses deux variants d'épissage p55 $\alpha$  et p50 $\alpha$ , p85 $\beta$  ou p55 $\gamma$ ) et d'une sous-unité catalytique (p110 $\delta$  essentiellement leucocytaire, p110 $\alpha$  ou p110 $\beta$ , ubiquitaires). Elles sont activées grâce au recrutement des domaines SH2 de la sous-unité régulatrice sur des motifs consensus YxxM phosphorylés lors de l'engagement d'un récepteur couplé à des tyrosine kinases. La p110, ainsi adressée à la membrane, catalyse la synthèse de PtdIns(3,4)P<sub>2</sub> et de PtdIns(3, 4, 5)P<sub>3</sub>, deux 3'-phosphoinositides (3'-PI) quasiment indétectables dans la membrane plasmique à l'état basal et qui recrutent sélectivement des protéines à domaine PH (*Pleckstrin homology*) comme la sérine/thrénine kinase Akt, les kinases de la famille Tec ou les facteurs d'échange pour les petites protéines G de la famille Rho (*Figure 1*). Ces protéines activent à leur tour un grand nombre d'effecteurs impliqués dans le contrôle de la survie, de la prolifération et de la mobilité cellulaire. Le domaine PH d'Akt fusionné à la GFP a été utilisé comme biosenseur pour visualiser les sites de production de 3'-PI au cours des processus biologiques. Cette approche a permis de démontrer l'existence d'une production massive de 3'-PI lors de la formation d'un contact entre des cellules T primaires et des CPA en présence d'antigène. Toutefois, le LT échappe au paradigme classique de régulation des 3'-PI tel qu'il a été décrit pour les neutrophiles ou les fibroblastes en migration dans un

gradient chimiotactique. Alors que ces cellules présentent une augmentation transitoire du niveau de 3'-PI restreinte au bord migrant, les cellules T stimulées par l'antigène montrent une accumulation des 3'-PI dans l'ensemble de leur membrane plasmique, bien au-delà de la synapse, et ce pendant plusieurs heures [6]. Afin de préciser les bases moléculaires régissant ce métabolisme particulier des 3'-PI, nous avons récemment analysé la localisation en temps réel de la sous-unité p85 $\alpha$  fusionnée à la GFP dans les cellules T humaines primaires stimulées par l'antigène. Notre étude révèle un recrutement massif et polarisé de la PI3K à l'interface T/CPA dès l'initiation du contact [8]. Nous avons montré que ce recrutement est stable pendant plusieurs heures et qu'il est corrélé à une accumulation prolongée de phosphotyrosines (pTyr) à la synapse, ce qui suggère une implication majeure des PI3K de classe  $I_A$  activées *via* un mécanisme dépendant des interactions pTyr-SH2. En outre, des expériences de *photobleaching* nous ont permis de démontrer la diffusion rapide des 3'-PI au sein de la membrane plasmique de la cellule T, permettant de concilier une activation polarisée de la PI3K exclusivement synaptique et une redistribution étendue des 3'-PI dans toute la membrane.




**Figure 1. Activation des PI3K de classe  $I_A$  à la synapse immunologique.** Lors d'un contact entre un lymphocyte T et une CPA, la PI3K est recrutée, grâce aux domaines SH2 de sa sous-unité régulatrice p85 $\alpha$ , au niveau d'adaptateurs phosphorylés sur des résidus tyrosine par les kinases activées en aval du TCR. À ce jour, plusieurs adaptateurs candidats ont été proposés dont CD28 et LAT. La sous-unité catalytique p110, ainsi adressée à la membrane, phosphoryle les phosphoinositides membranaires sur la position 3 du groupement inositol, engendrant en particulier du PtdIns(3, 4, 5)P<sub>3</sub> (PIP<sub>3</sub>) qui diffuse alors dans l'ensemble de la membrane plasmique. Le PtdIns(3, 4, 5)P<sub>3</sub> est reconnu spécifiquement par le domaine PH de PDK1, une sérine-thrénine kinase qui phosphoryle et active Akt. CPA : cellule présentatrice de l'antigène ; TCR : récepteur T de l'antigène ; PTK : protéine tyrosine kinase ; PtdIns : phosphatidylinositol ; PIP<sub>2</sub> : phosphatidylinositol-(4,5)-biphosphate ; PIP<sub>3</sub> : phosphatidylinositol-(3,4,5)-triphosphate ; PH : *pleckstrin homology* ; SH2 : *Src-homology domain 2* ; PDK1 : *phosphoinositide-dependent kinase 1*.



une dégradation de FoxO1 par le protéasome 26S après sa phosphorylation par Akt [20]. L'ensemble de ces mécanismes concourt à diminuer la transactivation par les FoxO de leurs gènes cibles, impliqués essentiellement dans l'inhibition du cycle cellulaire et l'induction de l'apoptose [21]. La nature des gènes régulés par les FoxO dépend à la fois de l'isoforme impliquée, du type cellulaire et des associations éventuelles avec différents cofacteurs. Elle pourrait aussi être modulée par le niveau d'acétylation des FoxO. Ainsi, l'association de FoxO3a avec la désacétylase SIRT1 favorise, en conditions de stress oxydatif, la transcription des gènes de résistance au stress tels que *Gadd45* ou *MnSOD*, au détriment des gènes pro-apoptotiques [22]. Ce phénomène pourrait s'avérer essentiel dans le maintien d'un phénotype quiescent stable en évitant l'accumulation de lésions cellulaires.

L'activation transcriptionnelle des gènes pro-apoptotiques *FasL* et *Bim* par FoxO3a est l'une des mieux documentées dans les cellules T [13, 21]. Ainsi, Stahl *et al.* ont montré, dans la lignée T CTLL-2, que l'induction de *Bim* consécutive à la privation en IL-2 induit une forte apoptose pouvant être mimée par des inhibiteurs de la PI3K ou par la surexpression d'une forme constitutivement nucléaire de FoxO3a [13]. Cette voie de signalisation joue probablement un rôle crucial dans l'homéostasie du système immunitaire dans la mesure où *Bim* apparaît comme un régulateur majeur de la survie lymphocytaire *in vivo*. En effet, les souris *bim*<sup>-/-</sup> présen-



**Figure 3.** Akt régule l'exclusion nucléaire de FoxO1 dans les cellules T. **A.** La forme active d'Akt phosphoryle les facteurs transcriptionnels FoxO sur trois positions consensus (Thr14, Ser256 et Ser319 pour FoxO1), ce qui stimule leur prise en charge par la machinerie d'export nucléaire dépendante de la GTPase Ran et leur rétention dans le cytoplasme *via* leur association à 14-3-3. NES : nuclear export sequence ; NLS : nuclear localisation sequence ; DBD : DNA binding domain. **B.** Distribution d'une protéine de fusion FoxO1-GFP dans les lymphocytes T humains primaires au repos (en haut à gauche) et après 20 minutes de contact avec des cellules dendritiques chargées en super-antigène (en bas à gauche). Une forme de FoxO1 mutée sur les trois résidus phosphorylés par Akt demeure constitutivement nucléaire après stimulation (en bas à droite).

tent une pathologie rénale auto-immune, un développement T anormal et une hyperprolifération lymphoïde et myéloïde [23]. Les FoxO peuvent également stimuler l'apoptose en induisant Bcl-6, un répresseur transcriptionnel de Bcl-xL [24] ; à l'inverse, une induction de Bcl-xL a été rapportée dans des cellules T murines transgéniques exprimant une forme constitutivement active d'Akt [18].

Les facteurs FoxO activent aussi la transcription de protéines impliquées dans le maintien d'un état de quiescence cellulaire, parmi lesquelles l'inhibiteur des cdk p27kip1 [13, 25], p130/Rb qui séquestre le facteur transcriptionnel E2F-4 nécessaire à l'entrée en phase G1 [26], et la cycline G2 abondante dans les lymphocytes où elle bloque le cycle en phase G0 [27]. La surexpression d'une forme active de FoxO induit ainsi un arrêt du cycle cellulaire dans les cellules T leucémiques Jurkat et dans la lignée murine CTLL-2, ce qui est corrélé à une expression accrue de p27kip1. À l'inverse, l'expression d'un transgène codant un mutant dominant négatif de FoxO1 accroît la prolifération des thymocytes [28]. En accord avec la nature de leurs cibles cellulaires, les FoxO apparaissent donc comme de puissants gènes suppresseurs de tumeurs et sont d'ailleurs fréquemment affectés par des translocations chromosomiques dans des pathologies cancéreuses, notamment des rhabdomyosarcomes de l'enfant et des leucémies aiguës. Leur importance *in vivo* a été confirmée par le fait que des souris déficientes en FoxO3a présentent des désordres lymphoprolifératifs et un syndrome inflammatoire systémique associés à une activité accrue de NF- $\kappa$ B [29]. FoxO3a inhiberait en effet NF- $\kappa$ B en stimulant l'expression de I $\kappa$ B $\beta$  et I $\kappa$ B $\epsilon$ . Les FoxO constituent donc un carrefour majeur entre plusieurs voies de signalisation et jouent un rôle central dans l'homéostasie du système immunitaire et dans le maintien de la tolérance T. Néanmoins, aucune étude directe de la localisation de ces facteurs au cours de la stimulation des cellules T n'avait été réalisée jusqu'à récemment.

### **L'exclusion nucléaire de FoxO1 en aval de la synapse immunologique est requise pour l'entrée en cycle des cellules T**

Nous avons montré en vidéo-microscopie que la stimulation antigénique de cellules T humaines primaires induit l'exclusion nucléaire du facteur transcriptionnel FoxO1 selon un processus rapide et non polarisé initié cinq à dix minutes après l'établissement du contact avec la CPA [8]. A l'image de l'activation de la PI3K, ce processus est maintenu pendant plusieurs heures et réversible par l'ajout d'un inhibiteur de la PI3K. En outre, une forme de FoxO1 mutée sur les trois résidus phosphorylés par Akt reste confinée dans le noyau, attestant du rôle joué par la voie PI3K/Akt dans le processus d'exclusion (Figure 3). Ce phénomène est fonctionnellement important puisque la surexpression du mutant constitutivement nucléaire bloque la croissance cellulaire induite par l'antigène *in vitro*. Dans ce cas, l'absence de cellules blastiques n'est pas due à un défaut d'activation précoce des cellules T, ni à un accroissement significatif de l'apoptose mais est corrélée à une réduction du contenu en acides nucléiques témoignant d'un blocage de l'entrée en cycle.

Des résultats analogues ont été obtenus avec des cellules B murines infectées par des rétrovirus codant les formes actives de FoxO1 et FoxO3a [30].

### **Conclusions**

L'activation prolongée de la PI3K au sein de la synapse immunologique permet de déplacer le trafic nucléocytoplasmique de FoxO1 en faveur de la forme cytoplasmique inactive, et ce pendant de longues périodes, ce qui permet aux cellules T d'entrer en cycle. La longue durée de vie des signaux issus du TCR et/ou de molécules de costimulation constitue donc probablement un moyen direct permettant aux LT et aux CPA de maintenir les cascades métaboliques dépendantes de la PI3K afin de mettre en place les différentes étapes nécessaires à l'expansion clonale des cellules T en réponse à l'antigène.  $\diamond$

### **SUMMARY**

#### **PI3-kinase : linking immunological synapse to T-cell proliferation**

T cell clonal expansion contributing to host defense against pathogens is a tightly controlled process to maintain the homeostasis of the immune system. Our understanding of how T cell growth and proliferation are controlled following antigenic stimulation is therefore a major challenge. Antigen recognition occurs when a naive T lymphocyte contacts an antigen-presenting cell. A specialized junction enriched in T-cell receptors, costimulation molecules and signaling adaptors, called the immunological synapse, is then created for several hours between the two cell types. Recent discoveries now clarify the molecular mechanisms used by this organization to control T cell growth and proliferation. It has been established that the immunological synapse functions in fact as an integrative platform where class la phosphoinositide-3-kinases (PI3Ks) are recruited and activated to continuously produce high levels of 3'-phosphoinositides. These lipids regulate the localization and the activation of a wide range of PH-domain containing proteins, among which the serine-threonine kinase Akt, a downstream effector of PI3Ks, appears to be a key player. FoxO (Forkhead subgroup O) family members control in various cell systems genes implicated in apoptosis, stress resistance and cell cycle arrest, thereby contributing to maintain quiescence in unstimulated cells. In naive T cells contacting antigen-presenting cells a rapid but also very prolonged nuclear exclusion of these transcription factors is observed downstream of Akt. Mainly, this compartmentalization process is mandatory to induce T cell growth triggered

by the T cell/antigen-presenting cell interaction. These findings demonstrate that to initiate cell cycle progression the formation of the immunological synapse is an undemanding tactic used by primary T cells to securely maintain the 3'-phosphoinositide-dependent mitotic switch governed by the spatial control of FoxO transcription factors. ♦

## REMERCIEMENTS


Nous tenons à remercier le comité organisateur du Congrès des Jeunes Chercheurs de l'Université Paris5-René Descartes qui est à l'origine de cette collaboration avec la revue médecine/sciences. Nos travaux ont bénéficié du soutien financier du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (S.F.), de la Ligue Nationale contre le Cancer, de l'Inserm et du CNRS.

## RÉFÉRENCES

- Van der Merwe PA. Formation and function of the immunological synapse. *Curr Opin Immunol* 2002 ; 14 : 293-8.
- Germain RN, Jenkins MK. *In vivo* antigen presentation. *Curr Opin Immunol* 2004 ; 16 : 120-5.
- Huppa JB, Gleimer M, Sumen C, Davis MM. Continuous T cell receptor signaling required for synapse maintenance and full effector potential. *Nat Immunol* 2003 ; 4 : 749-55.
- Hurez V, Saparov A, Tousson A, et al. Restricted clonal expression of IL-2 by naive T cells reflects differential dynamic interactions with dendritic cells. *J Exp Med* 2003 ; 198 : 123-32.
- Harriague J, Bismuth G. Imaging antigen-induced PI3K activation in T cells. *Nat Immunol* 2002 ; 3 : 1090-6.
- Costello PS, Gallagher M, Cantrell DA. Sustained and dynamic inositol lipid metabolism inside and outside the immunological synapse. *Nat Immunol* 2002 ; 3 : 1082-9.
- Koyasu S. The role of PI3K in immune cells. *Nat Immunol* 2003 ; 4 : 313-9.
- Fabre S, Lang V, Harriague J, et al. Stable activation of phosphatidylinositol 3-kinase in the T cell immunological synapse stimulates Akt signaling to FoxO1 nuclear exclusion and cell growth control. *J Immunol* 2005 ; 174 : 4161-71.
- Fruman DA, Snapper SB, Yballe CM, et al. Impaired B cell development and proliferation in absence of phosphoinositide 3-kinase p85alpha. *Science* 1999 ; 283 : 393-7.
- Okkenhaug K, Bilancio A, Farjot G, et al. Impaired B and T cell antigen receptor signaling in p110delta PI 3-kinase mutant mice. *Science* 2002 ; 297 : 1031-4.
- Suzuki A, Yamaguchi MT, Ohteki T, et al. T cell-specific loss of Pten leads to defects in central and peripheral tolerance. *Immunity* 2001 ; 14 : 523-34.
- Yoo JK, Cho JH, Lee SW, Sung YC. IL-12 provides proliferation and survival signals to murine CD4+ T cells through phosphatidylinositol 3-kinase/Akt signaling pathway. *J Immunol* 2002 ; 169 : 3637-43.
- Stahl M, Dijkers PF, Kops GJ, et al. The forkhead transcription factor FoxO regulates transcription of p27Kip1 and Bim in response to IL-2. *J Immunol* 2002 ; 168 : 5024-31.
- Sade H, Sarin A. IL-7 inhibits dexamethasone-induced apoptosis via Akt/PKB in mature, peripheral T cells. *Eur J Immunol* 2003 ; 33 : 913-9.
- Blain SW, Massague J. Breast cancer banishes p27 from nucleus. *Nat Med* 2002 ; 8 : 1076-8.
- Del Peso L, Gonzalez-Garcia M, Page C, et al. Interleukin-3-induced phosphorylation of BAD through the protein kinase Akt. *Science* 1997 ; 278 : 687-9.
- Ohteki T, Parsons M, Zakarian A, et al. Negative regulation of T cell proliferation and interleukin 2 production by the serine threonine kinase GSK-3. *J Exp Med* 2000 ; 192 : 99-104.
- Jones RG, Parsons M, Bonnard M, et al. Protein kinase B regulates T lymphocyte survival, nuclear factor kappaB activation, and Bcl-X(L) levels *in vivo*. *J Exp Med* 2000 ; 191 : 1721-34.
- Birkenkamp KU, Coffey PJ. FOXO transcription factors as regulators of immune homeostasis : molecules to die for ? *J Immunol* 2003 ; 171 : 1623-9.
- Matsuzaki H, Daitoku H, Hatta M, et al. Insulin-induced phosphorylation of FKHR (Foxo1) targets to proteasomal degradation. *Proc Natl Acad Sci USA* 2003 ; 100 : 11285-90.
- Brunet A, Bonni A, Zigmond MJ, et al. Akt promotes cell survival by phosphorylating and inhibiting a Forkhead transcription factor. *Cell* 1999 ; 96 : 857-68.
- Brunet A, Sweeney LB, Sturgill JF, et al. Stress-dependent regulation of FOXO transcription factors by the SIRT1 deacetylase. *Science* 2004 ; 303 : 2011-5.
- Bouillet P, Metcalf D, Huang DC, et al. Proapoptotic Bcl-2 relative Bim required for certain apoptotic responses, leukocyte homeostasis, and to preclude autoimmunity. *Science* 1999 ; 286 : 1735-8.
- Tang TT, Dowbenko D, Jackson A, et al. The forkhead transcription factor AFX activates apoptosis by induction of the BCL-6 transcriptional repressor. *J Biol Chem* 2002 ; 277 : 14255-65.
- Medema RH, Kops GJ, Bos JL, Burgering BM. AFX-like Forkhead transcription factors mediate cell-cycle regulation by Ras and PKB through p27kip1. *Nature* 2000 ; 404 : 782-7.
- Kops GJ, Medema RH, Glassford J, et al. Control of cell cycle exit and entry by protein kinase B-regulated forkhead transcription factors. *Mol Cell Biol* 2002 ; 22 : 2025-36.
- Martinez-Gac L, Marques M, Garcia Z, et al. Control of cyclin G2 mRNA expression by forkhead transcription factors : novel mechanism for cell cycle control by phosphoinositide 3-kinase and forkhead. *Mol Cell Biol* 2004 ; 24 : 2181-9.
- Leenders H, Whiffield S, Benoist C, Mathis D. Role of the forkhead transcription family member, FKHR, in thymocyte differentiation. *Eur J Immunol* 2000 ; 30 : 2980-90.
- Lin L, Hron JD, Peng SL. Regulation of NF-kappaB, Th activation, and autoinflammation by the forkhead transcription factor Foxo3a. *Immunity* 2004 ; 21 : 203-13.
- Yusuf I, Zhu X, Kharas MG, et al. Optimal B-cell proliferation requires phosphoinositide 3-kinase-dependent inactivation of FOXO transcription factors. *Blood* 2004 ; 104 : 784-7.

## TIRÉS À PART

S. Fabre



**Tarifs d'abonnement M/S - 2006**

**Abonnez-vous**

**à Médecine/Sciences**

**> Depuis 20 ans, grâce à m/s, vous vivez en direct les progrès des sciences biologiques et médicales**

---

**Bulletin d'abonnement page 791 dans ce numéro de m/s**

